

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๗๔๗๐๖/ว

๗๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๓๑๒๐

๑๗

มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคอหิวาต์จากไวรัสโรต้า

เรียน ท่าน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธ์

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข มีการควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กเล็กที่สามารถเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ นั้น ทางกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง มีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เพื่อลดการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ

ดังนั้น กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ประชาชนและผู้ปกครองเด็กเล็กได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ และขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร กันหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร/โทรสาร ๐ ๔๔๖๖ ๖๓๕๖

www.banyanglocal.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....

อัจฉริยะรู้จาก ไวรัสโรต้า



ไวรัสโรต้า (Rotavirus) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงส่วนใหญ่เกิดในทารกและเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี เกือบทุกคนจะเคยติดเชื้อไวรัสชนิดนี้แล้ว

การติดต่อ

- การรับประทานอาหาร หรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค




- การสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าสู่ทางปาก



ระยะฟักตัวของโรค

1-2 วันหลังจากได้รับเชื้อ



อาการและอาการแสดง

- ไข้
- อาเจียน
- ท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ
- หลังจากนั้นจะมีอาการถ่ายเหลวรุนแรงมากขึ้น



การป้องกันโรค

- ใส่ใจสุขอนามัย โดยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้น้ำสะอาด



- หมั่นทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก



- การรับวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า เป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูง บลอสต์สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้




2 หลีกเลี่ยงการคลุกคลีหรือสัมผัสผู้ป่วย



3 ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ



4 หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ การก่อกองไฟ ควันหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี



5 รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ดื่มน้ำมากๆ และให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอ



กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 โทร. 0 - 2203-2887 - 9
www.bangkok.go.th/healthhealthbangkok



ไวรัสอาร์เอสวี (Respiratory Syncytial Virus, RSV)




กคร. 02/03/62

RSV

คืออะไร ?

Respiratory Syncytial Virus (RSV)



เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝนหรือปลายฝนต้นหนาว



การติดต่อ

สามารถติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น ใต้เก้าอี้ ลูกบิดประตู ของเล่น ฯลฯ และผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จาม ของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย โดยเชื้อไวรัสอาร์เอสวีสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมงและสามารถอยู่คู่มือของเราได้นานประมาณ 30 นาที

อาการ



• ไข้สูง



• ไอมาก และมีเสมหะมาก
• ชีमลง



• หายใจลำบาก หอบเหนื่อย



• ตัวเขียว จากการขาดออกซิเจน

การรักษา



ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ ยาแก้ไอละลายเสมหะ ในเด็กบางรายที่มีเสมหะมาก ต้องเพาะปอดและดูดเสมหะออกเพื่อลดความรุนแรงของอาการไอและหายใจหอบเหนื่อยได้ ยาปฏิชีวนะไม่มีประโยชน์หากไม่มีเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน

การป้องกัน



1. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่



ย้อนกลับ

Share 3 0 11

อีเมล

Copy Link

View : 28545

31

โทรศัพท์กลาง

02-203-2885

โทรสาร

Social



ข้อตกลงการใช้งาน แผนผังเว็บไซต์

กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๗๔๗๐๖/ว ๘๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า

เรียน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธ์

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข มีการควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กเล็กที่สามารถเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ นั้น ทางกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง มีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เพื่อลดการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ

ดังนั้น กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ประชาชนและผู้ปกครองเด็กเล็กได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือด้วยดี เช่นเคย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร กัณหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร/โทรสาร ๐ ๔๔๖๖ ๖๓๕๖
www.banyanglocal.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
หน้า.....



อาการ



เกิดการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร โดยเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะอาศัยอยู่บริเวณลำไส้เล็ก ส่วนต้น และทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และเกิดความผิดปกติของการดูดซึมไขมันและน้ำตาลของลำไส้เล็ก มีระยะฟักตัวสั้น 12 - 48 ชั่วโมง หลังรับเชื้อ จึงมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารเป็นพิษ มีอาการคล้ายกัน คือ อาเจียนรุนแรง ปวดมวนท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ ไข้ต่ำๆ และจะมีอาการรุนแรงใน เด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ

2 การสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้ออยู่ แล้วนำนิ้วเข้าปาก โดยเฉพาะในเด็ก



เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เชื้อนี้ทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ และแอลกอฮอล์ได้ดี จึงไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสนี้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ง่ายแม้ร่างกายได้รับเชื้อในปริมาณเล็กน้อย และใช้เวลากว่า 1 เดือนในการแพร่กระจายเชื้อ

การติดต่อ

สามารถติดต่อได้ง่ายจากคนสู่คน ด้วยพฤติกรรม ดังนี้

1 การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงไม่สุก เช่น อาหารทะเล ผัก ผลไม้สดที่ล้างไม่สะอาด



อาหารที่ปนเปื้อน



น้ำดื่มที่ปนเปื้อน



ผักสดที่ไม่สะอาด

3 การหายใจใกล้กับผู้ป่วยที่อาเจียน และหายใจเอาละออง อาเจียนของผู้ป่วยเข้าไป



การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มียาที่รักษาเชื้อไวรัสนี้ โดยเฉพาะ เป็นการรักษาตามอาการ เช่น การให้สารน้ำและเกลือแร่ทดแทน ถ้ามีภาวะขาดน้ำ เป็นต้น



วัคซีนไวรัสโรต้า



วัคซีนนี้สามารถให้ร่วมกับวัคซีนชนิดอื่นๆ ได้โดยสามารถนำบุตรหลาน อายุ 2 เดือน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครไปรับการหยอดวัคซีนไวรัสโรต้า ฟรีที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขสูง สำนักงานมีทุกแห่ง



กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 - 2203-2887 - 9
www.bangkok.go.th/health
healthbangkok



วัคซีนป้องกันโรค

ปัจจุบันมีวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ในประเทศไทย 2 ชนิด คือ วัคซีนชนิด 1 สายพันธุ์ หยอด 2 ครั้ง เมื่ออายุ 2 และ 4 เดือน และวัคซีนชนิด 5 สายพันธุ์ หยอด 3 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน โดยวัคซีนสามารถลดการป่วยหรือลดความรุนแรงของโรคได้

อุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า

